

### A. Espacios campiñeses alomados margosos de baja altura, agrotensivos y agrícolas en seco, con presencia destacable de entornos de dominante natural y cultivos forestales

Este tipo paisajístico presenta una distribución espacial fragmentaria, que se extiende por las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, estando constituido en buena parte de su territorio por espacios campiñeses de suaves relieves y morfologías alomadas o acolinadas. Los terrenos aluviales asociados al cauce del Guadalquivir separan las dos principales secciones que componen esta tipología: la situada en la margen derecha del río, se localiza en su mayor parte en la provincia de Huelva apareciendo como una franja de dirección E – O situada entre los espacios de Riotinto y El Andévalo al norte y las marismas del Guadiana, Tinto, Odiel, Guadalquivir y las arenas de Doñana al sur. La superficie restante aparece en la parte centro occidental de la provincia de Sevilla (espacios campiñeses del entorno de Gerena y la parte occidental del Aljarafe). Por último, ya en la margen izquierda del río y en la provincia gaditana, aparece la segunda gran sección del tipo, que presenta una morfología muy similar al caso anterior y cubre buena parte de la costa noroeste de Cádiz, los espacios campiñeses jerezanos, la bahía y la sierra de Cádiz.

Altitudinalmente, en la mitad occidental del tipo, se observa un claro gradiente norte – sur, aumentando esta variable desde el límite meridional hasta su borde norte, sin sobrepasar los 200 m s.n.m. El sector sureste presenta una distribución altitudinal más irregular, apareciendo terrenos elevados sobre espacios más deprimidos, que fisiográficamente se corresponden con mantos eólicos, cubetas de relleno endorreico, lechos fluviales y llanuras de inundación, sobre los que se encaja la red fluvial existente.

El roquedo presenta una composición lítica acorde con el ambiente sedimentario en el que se localiza, predominando claramente los materiales margosos (78% de la superficie) y siendo también reseñable la presencia de arenas y gravas en la parte suroriental del sector onubense-sevillano del tipo, que constituyen la transición hacia los espacios marismesños del entorno de Doñana. Ya en la provincia gaditana, la mitad sureste del tipo aparece como un espacio más homogéneo donde predominan de forma casi exclusiva los espacios margosos, y resultan características las terrazas marinas formadas por conglomerados que discurren paralelas a la costa entre Rota y Chipiona.

Climáticamente, se trata de un espacio mediterráneo, donde los valores de humedad, precipitación y temperatura quedan matizados por la posición de cada punto en el tipo, desde los espacios más cercanos al Atlántico hasta aquellos que se interonan en las campiñas norteñas más influenciadas por la continentalidad. En el primer caso, la cercanía del mar suaviza las temperaturas, eliminando la aparición de heladas invernales y hace aumentar la humedad, contribuyendo la falta de barreras orográficas significativas a que este efecto se deje sentir muchos kilómetros hacia el interior. En la mitad oriental del sector norte, por el contrario, la continentalidad aumenta de forma significativa, dándose oscilaciones térmicas más acusadas y apareciendo heladas en los meses más fríos.

Edafología, litología y clima, condicionan la vegetación potencial del tipo, en la que se ven representadas hasta seis series de vegetación potencial termomediterráneas, que incluyen desde un amplio catálogo de especies esclerófilas y adaptadas a los exigentes periodos de estiaje y altas temperaturas de estos espacios (encina, alcornoque, lentisco, retama, esparto...), hasta especies halófilas en aquellos ambientes de mayor salinidad próximos a los espacios marismesños meridionales.

Actualmente, se presenta un espacio totalmente antropizado donde la presencia de vegetación natural es escasa, dedicándose un 73% del territorio a cultivos agrícolas, bien de secano tradicional (30%), donde destacan las plantaciones de viñedo del sector gaditano (Sanlúcar, Chipiona, Trebujena y Jerez) y el onubense de El Condado (entorno de Bollullos), o bien de tipo agrotensivo (43%) donde aparecen cultivos tanto leñosos como herbáceos, extensiones bajo plástico y también el viñedo en torno al núcleo de Almonte, en este caso asociado con el olivar. Los cultivos forestales también ocupan una importante superficie (cerca al 10%) y su concentración en el sector norte del tipo, contribuye de forma importante a definir su carácter paisajístico. Una situación parecida se da en relación a los espacios de dominante natural, localizados también en su mayor parte en los espacios septentrionales y ocupando un 13% de la superficie total. Se trata de superficies cubiertas fundamentalmente por matorral y pastizal donde aparecen en ocasiones elementos arbóreos de forma dispersa. Finalmente, es destacable la alta densidad de espacios urbanos y periurbanos presentes: al norte, se presenta una red polinuclear de asentamientos de tamaño medio en torno al eje tradicional de comunicaciones entre Sevilla y Huelva, mientras que en el sector sur, destaca el núcleo de Jerez de la Frontera y su área de influencia, apareciendo otros importantes núcleos como El Puerto de Santa María, Rota, Chipiona o Sanlúcar de Barrameda, así como municipios con rasgos netamente agrarios, como son Trebujena y Lebrija.




Tabla 1. Clases por variable para el tipo paisajístico.

Variable	Clase	Porcentaje
Roquedo	Arcillas, limos y arenas	0,01
	Arenas y gravas	0,13
	Conglomerados	0,06
	Margas	0,78
	Pizarras	0,02
Formas del Relieve	Cobertera detrítica y depósito de pie de monte	0,36
	Colinas	0,39
	Formas de abrasión	0,01
	Llanuras y lomas	0,05
	Marismas fluviales y sistemas endorreicos	0,01
	Relieves tabulares	0,06
	Vegas y llanuras de inundación	0,11
Altitud	< 10 m	0,03
	10 - 30 m	0,19
	30 - 100 m	0,66
	100 - 200 m	0,11
Usos y coberturas del suelo	Suelo artificial	0,06
	Espacios agro-intensivos e infraestructuras asociadas	0,43
	Espacios agrícolas de secano	0,30
	Cultivos forestales	0,08
	Dehesas	0,01
	Espacios de dominante natural	0,13



Foto 1. Campiñas próximas a la Junta de los Ríos con la sierra de Cádiz al fondo. Autor: Rafael Medina Borrego.



Foto 2. Mosaico de cultivos al sur de Rociana del Condado. Autor: Rafael Medina Borrego.



Foto 3. Palomares en la campiña de Trigueros. Autor: Rafael Medina Borrego.